Fecha: 09/03/2016		
Cliente: KIN	CO63501602	
Producto: STD Kin Gingival Prospecto		P.281C
Comentarios: medidas 620X155		

620 x 155 mm

10 mm

10 mm

10 mm

KIN® GINGIVAL — ES

0.12 % Chlorhexidine DG

El biofilm o placa dental es el origen de diversas alteraciones orales.

El digluconato de clorhexidina tiene una demostrada actividad antiplaca.

KIN® GINGIVAL incorpora Alpantha, un complejo formado por provitamina B_5 y alantoína, el cual potencia la absorción de ambas sustancias ayudando a fortalecer y tonificar el tejido gingival.

Indicaciones:

- Promueve la reducción del biofilm dental.
- Refuerza y tonifica las encías delicadas.
- Higiene bucal en procedimientos periodontales (Enjuague bucal).

Contraindicaciones:

Está contraindicado en pacientes que hayan mostrado reacción de hipersensibilidad a la clorhexidina.

Advertencias:

- En algunos casos puede presentarse alteración del gusto y sensación urente en la lengua, que generalmente disminuyen con el uso continuado del producto.
- Tras el uso prolongado y al contacto con ciertas bebidas y alimentos tales como vino tinto, café y también con el tabaco puede presentarse coloración de los dientes y de los empastes. Esta coloración no es permanente y puede eliminarse con una profilaxis dental adecuada.

Modo de uso:

Pasta dentífrica

Cepillarse los dientes durante 2 ó 3 minutos, como mínimo 2 veces al día, preferentemente después de cada comida y antes de acostarse.

Enjuague bucal

Efectuar dos enjuagues al día, mañana y noche, con 15 ml de producto sin diluir, durante 30 segundos. Es aconsejable no ingerir alimentos ni bebidas hasta transcurrido un mínimo de media hora después de su uso.

También se puede utilizar un irrigador oral, diluyendo la solución de **KIN® GINGIVAL** con agua 1:1 ó 2:1.

No ingerir.

Como complemento idóneo de **KIN® GINGIVAL** enjuague bucal, se aconseja el uso de **KIN® GINGIVAL** pasta dentífrica, siguiendo las instrucciones de su odontólogo.

Se recomienda usar **KIN® GINGIVAL** durante 2 semanas o seguir las indicaciones de su dentista.

Conservación: Mantener a temperatura inferior a 30º C.

Formatos de presentación (disponibilidad en función del país):
KIN® GINGIVAL enjuague bucal: frasco con 250 y 500 ml.
KIN® GINGIVAL pasta dentífrica: tubo con 75 ml.

El consejo de su odontólogo y de su farmacéutico le garantiza una óptima salud bucodental.

CO63501602

KIN
LABORATORIOS KIN S.A.
Ciutat de Granada, 123 E-08018 Barcelona - Spain
www.kin.es - e-mail: kin@kin.es

KIN® GINGIVAL — PT

0.12 % Chlorhexidine DG

O biofilme ou placa dental é a origem de diversas alterações orais.

O digluconato de clorohexidina tem uma demostrada actividade anti-placa.

KIN® GINGIVAL incorporou-se Alpantha, um complexo formado por pró-vitamina B_5 e alantoína, que potencia a absorção de ambas substâncias assim isto ajuda a tonificar e a fortalecer o tecido gengival.

Utilizações:

- Promove a redução do biofilme dental.
- Reforça e tonifica as gengivas.
- Higiene bucal em procedimentos periodontais (Colutório).

Contra-indicações:

Não deve ser utilizado por quem tenha apresentado reacções de hipersensibilidade à clorohexidina.

Advertencias:

- Nalguns casos podem surgir alterações do sentido do gosto que geralmente diminuem com o uso continuado do produto.
- Depois de uma utilização prolongada e devido ao contacto com determinadas bebidas e alimentos tais como vinho ou café, assim como o tabaco, pode aparecer coloração nos dentes e as restaurações estéticas. Esta coloração pode eliminarse com uma profilaxia dental.

Posologia e normas para a correcta administração:

Pasta dentífrica

Escovar os dentes durante 2 ou 3 minutos, no mínimo duas vezes ao dia preferencialmente depois das refeições e antes de deitar.

Colutório

Efectuar bochechos com 15 ml de produto, sem diluir, 2 vezes ao dia, durante 30 segundos, depois da escovagem. É aconselhável não ingerir alimentos nem bebidas enquanto não tiver decorrido no mínimo meia hora depois da sua utilização.

Também se pode utilizar um irrigador oral, diluindo a solução de **KIN® GINGIVAL** com água 1:1 ou 2:1.

Não ingerir.

Como complemento idóneo de **KIN® GINGIVAL** colutório, aconselhamos o uso de **KIN® GINGIVAL** pasta dentífrica, seguindo as instruções do seu odontólogo.

É aconselhável utilizar **KIN® GINGIVAL** durante 2 semanas o seguir as instruções do seu odontólogo.

Conservação: Manter a temperatura inferior a 30º C.

Apresentações (somente disponível em alguns mercados):
KIN® GINGIVAL colutório: frasco com 250 y 500 ml.
KIN® GINGIVAL pasta dentífrica: tubo com 75 ml.

A conselho do seu odontólogo e seu farmatêutico irá garantir melhor saúde bucal.

KIN® GINGIVAL — EN

0.12 % Chlorhexidine DG

Biofilm or dental plaque is the origin of various oral alterations.

Chlorexidine digluconate has a demostrated antiplaque activity.

KIN® GINGIVAL promotes the reduction of dental biofilm. Furthermore, the formula includes Alpantha, a compound combining provitamin B_5 and allantoin, which potentiates the absorption of both substances. This helps to strengthen and tone the gingival tissue.

Indications:

- To promote the reduction of dental biofilm.
- To help strengthen and tone delicate gums.
- Oral hygiene during dental interventions (mouthwash).

Contraindications:

This product is contraindicated in patients that have demonstrated a hypersensitive reaction to chlorhexidine.

Precautions:

- Taste alterations may occur in some cases. This generally diminishes with continued use of the product.
- Staining of the teeth and fillings can occur after long term use and after contact with tobacco and certain food and beverages, such as red wine and coffee. This staining is not permanent and can be easily removed by your dentist.

Dosage and guidelines for administration:

Toothpaste

Brush teeth for 2 or 3 minutes, at least 2 times a day, preferably after meals and before bed time.

Mouthwash

Rinse twice a day, morning and night, for 30 seconds, with 15 ml of the undiluted product. It is recommended to not eat or drink until at least half an hour after the use of the product.

An oral irrigator can also be used, diluting the solution of **KIN® GINGIVAL** with water at 1:1 or 2:1.

Do not swallow.

As an ideal complement to **KIN® GINGIVAL** Mouthwash, we recommend the use of **KIN® GINGIVAL** Toothpaste, following the instructions of your dentist.

It is recommended to use **KIN® GINGIVAL** for 2 weeks or as advised by your dentist.

Conservation: Store product below 30º C.

Presentations: (only available in certain markets):
KIN® GINGIVAL mouthwash: 250 and 500 ml bottle.
KIN® GINGIVAL toothpaste: 75 ml tube.

Ask your dentist and pharmacist for advice. This will ensure optimal oral and dental health.

KIN® GINGIVAL — FR

0.12 % Chlorhexidine DG

Le biofilm (ou la plaque dentaire) est la cause déclenchant les altérations orales.

Le digluconate de chlorhexidine a une action anti plaque qui a été largement démontrée.

KIN® GINGIVAL est une formule qui contienne Alpantha, un composé qui unit la Provitamine B_5 et l'allantoïne qui renforcent l'absorption des deux substances; Ça aide à renforcer et tonifie le tissu gingival.

Indications:

- Aide à réduire le biofilm dentaire.
- Aide à renforcer et tonifie les gencives délicates
- Hygiène orale pour les interventions dentaires (bain de bouche).

Contre-indications:

Il est contre-indiqué chez les patients qui ont montré une réaction d'hypersensibilité à la chlorhexidine.

Avertissements:

- Altération du goût peut se produire dans certains cas. Cela diminue généralement avec l'utilisation continue du produit.
- Après une utilisation prolongée, et au contact de certaines boissons et aliments (comme le vin, café et / ou tabac), une coloration des dents et des plombages peut apparaître. Cette coloration n'est pas definitive. Elle peut être éliminée par votre chirurgien-dentiste.

Posologie et normes d'administration:

Pâte dentifrice

Se brosser les dents 2 à 3 minutes, au moins 2 fois par jour, après chaque repas et avant de se coucher.

Bain de bouche

Effectuer deux rinçages par jour, matin et soir, pendant 30 secondes, avec 15 ml du produit sans le diluer. Il est conseillé d'éviter de boire, de manger ou de se rincer la bouche dans le 30 minutes qui suivent.

On peut également utiliser un irrigateur oral, en diluant la solution de **KIN® GINGIVAL** avec l'eau 1:1 ou 2:1.

Ne pas avaler.

Comme complément idéal du bain de bouche **KIN® GINGIVAL,** nous conseillons l'utilisation de **KIN® GINGIVAL** pâte dentifrice, avec le conseil de votre chirurgien-dentiste.

Il est conseillé d'utiliser **KIN® GINGIVAL** pendant 2 semaines ou les conseils de votre dentiste.

Conservation: Maintenir le produit à moins de 30º C.

Présentations (ne pas disponibles dans certains marchés):
KIN® GINGIVAL bain de bouche : flacon à 250 et 500 ml.
KIN® GINGIVAL pâte dentifrice : 75 ml tube.

Le conseil de votre chirurgien-dentiste et pharmacien vous garantit une santébucco-dentaire optimale.

KIN® GINGIVAL — IT

0.12 % Chlorhexidine DG

Il biofilm o placca dentale è l'origine di varie alterazioni del cavo orale.

La Clorexidina digluconato ha dimostrato di avere attività antiplacca.

La formula comprende Alpantha, un composto che unisce provitamina B_5 e allantoina, che potenzia l'assorbimento di entrambe le sostanze. Questo aiuta a rafforzare e tonificare il tessuto gengivale.

Indicazioni
- Promuove la riduzione del biofilm dentale.
- Aiuta a rafforzare e tonificare le gengive delicate.
- Igiene orale durante gli interventi odontoiatrici (collutorio).

Controindicazioni:

Il prodotto è controindicato nei pazienti che hanno dimostrato una reazione di ipersensibilità alla clorexidina.

Precauzioni:

- Si può verificare alterazione del gusto in alcuni casi che diminuisce generalmente con l'uso continuativo del prodotto.
- Può verificarsi la colorazione dei denti e delle otturazioni dopo l'uso prolungato e dopo il contatto con il tabacco e di alcuni alimenti e bevande, come il vino rosso e caffè. Questa colorazione non è permanente e può essere facilmente rimosso dal vostro dentista o igienista.

Dosaggio e linee guida per l'utilizzo:

Dentifricio

Spazzolare i denti per 2 o 3 minuti, almeno due volte al giorno, preferibilmente dopo i pasti e prima di andare a dormire.

Collutorio

Risciacquare due volte al giorno, mattina e sera per 30 secondi, con 15 ml di prodotto non diluito. Si raccomanda di non mangiare o bere per almeno mezz'ora dopo l'uso del prodotto.

Se puó anche utilizzare uno irrigatore orale, diluendo la soluzione di **KIN® GINGIVAL** in acqua 1:1 ó 2:1

Non ingerire.

Per completare l'azione de **KIN® GINGIVAL** colluttorio, si consiglia l'uso di **KIN® GINGIVAL** pasta dentifricia. Prima spazzolare i denti con il dentifricio e dopo risciacquare con il colluttorio . Seguire sempre le indicazioni del dentista.

Si raccomanda di utilizzare **KIN® GINGIVAL** per 2 settimane o come indicato dal vostro dentista.

Condizioni di stoccaggio:
Conservare il prodotto a temperatura inferiore a 30º C.

Presentazioni :
KIN® GINGIVAL collutorio : 250 e 500 ml.
KIN® GINGIVAL Pasta dentifricia : 75 ml.

Il consiglio del vostro dentista e del vostro farmacista di fiducia vi garantiscono un'ottima salute orale.

KIN® GINGIVAL — PL

0.12 % Chlorhexidine DG

Zarówno biofilm jak i płytka bakteryjna odpowiadają za rozmaite schorzenia jamy ustnej.

Diglukonian Chlorheksydyny zapobiega powstawaniu płytki nazębnej.

KIN® GINGIVAL ogranicza występowanie biofilmu na powierzchni zębów. Dodatkowo wzmacnia tkanki dziąseł i przywraca ich napięcie. Dzieje się tak, za sprawą występującego w jego składzie kompleksu Alphanta, stanowiącego połączenie prowitaminy B_5 i alantoiny. Powiązanie w kompleks polepsza ich wchłanianie.

Wskazania:
- Wzmocnienie redukcji biofilmu na zębach.
- Ochrona i wzmocnienie wrażliwych dziąseł.
- Utrzymanie higieny jamy ustnej podczas leczenia chorób przyzębia. (płyn do płukania jamy ustnej).

Przeciwwskazania:

Produkt przeciwwskazany u pacjentów, z nadwrażliwością na chlorheksydynę.

Środki ostrożności:

- Czasami może wystąpić zaburzenie smaku. Efekt ten na ogół zmniejsza się w miarę dalszego korzystania z produktu.
- Po długotrwałym stosowaniu i kontakcie z tytoniem lub pewnymi rodzajami żywności i napojów, takimi jak np. czerwone wino czy kawa, mogą wystąpić przebarwienia zębów i wypełnień. Nie są one trwałe i mogą być łatwo usunięte przez dentystę.

Sposób użycia i dawkowanie:

Pasta do zębów

Szczotkować zęby przez 2 do 3 minut, co najmniej dwa razy dziennie, najlepiej po posiłkach i przed snem.

Płyn do płukania jamy ustnej

Płukać dwa razy dziennie, rano i wieczorem, przez 30 sekund, używając 15 ml nierozcieńczonego produktu. Zaleca się, aby nie jeść i nie pić conajmniej pół godziny po zastosowaniu produktu.

Można stosować do płukania przy użyciu irygatora. W tym przypadku należy rozcieńczyć Płyn Kin Gingival wodą w stosunku 1:1 lub 2:1.

Nie połykać.

Jako idealne uzupełnienie **KIN® GINGIVAL** Płyn do płukania ust, zalecamy używanie **KIN® GINGIVAL** pasta do zębów. Szczotkuj zęby używając pasty, po czym niezwłocznie wypłucz jamę ustną płynem. Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza stomatologa.

Używaj produktów **KIN® GINGIVAL** przez 2 tygodnie lub zgodnie z zaleceniami lekarza stomatologa.

Przechowywanie: Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 30 ºC.

Dostępne opakowania (niedostępne w niektórych krajach):
KIN® GINGIVAL płyn do płukania jamy ustnej: butelki o pojemności 250ml i 500ml.
KIN® GINGIVAL pasta do zębów: tuba 75ml.

W razie wątpliwości zapytaj swojego lekarza lub farmaceutę.
Zapewni to optymalną ochronę zdrowia jamy ustnej i zębów

KIN® GINGIVAL — NL

0.12 % Chlorhexidine DG

Bacteriën komen normaal in de mond voor en dragen bij aan de vorming van tandplaque (biofilm). Hierdoor zijn bacterien mede de oorzaak van delicaat tandvlees.

Door de ontwikeling van bacteriën tegen te gaan kan tandplaque vermeden worden en onder controle blijven.

KIN® GINGIVAL producten zijn uitstekend voor de intensieve verzorging van delicaat tandvlees.

KIN® GINGIVAL bevat Alpantha. Alphantha is een combinatie van provitamine-B_5 en allantoïne, deze combinatie bevordert de gezondheid van het tandvlees.

Indicaties:
Voorkomt de vorming van tandplaque
Verbetert de conditie van delicaat tandvlees
Tijdens en na mondheelkundige ingrepen

Wanneer niet te gebruiken:

Niet te gebruiken bij personen die overgevoelig zijn voor chloorhexidine of voor een van de bestanddelen.

Ongewenste effecten:
Een wijziging in gevoel of smaak kan voorkomen. Dit verdwijnt meestal bij voortgezet gebruik. Na langdurig gebruik kunnen tanden en vullingen verkleuren. Dit kan ook optreden bij gebruik van tabak, voeding en bepaalde dranken zoals wijn en koffie. Deze verkleuring kan eenvoudig verwijderd worden door uw tandarts of mondhygiënist.

Gebruiksaanwijzing:

Tandpasta
Poets de tanden minstens twee keer per dag gedurende 2 tot 3 minuten, bij voorkeur na elke maaltijd en voor het slapen gaan.

Mondspoelmiddel
Onverdund te gebruiken 2 maal per dag de mond met 15ml oplossing gedurende 30 seconden spoelen.

Na gebruik:
Niet doorslikken
Niet naspoelen met water
Niet poetsen
Niet eten of drinken gedurende minstens een half uur

Op aanraden van uw tandarts, apotheker of mondhygiënist is **KIN® GINGIVAL** Tandpasta ideaal te gebruiken in combinatie met het **KIN® GINGIVAL** mondspoelmiddel.

Bewaren: Bewaren op een temperatuur beneden 30°C.

Presentations:
KIN® GINGIVAL Mondspoelmiddel: 250 ml fles.
KIN® GINGIVAL Tandpaste: 75 ml tube.

Vraag advies aan uw tandarts, apotheker of mondhygiënist voor een optimale mond- en tandhygiëne.

KIN® GINGIVAL — DE

0.12 % Chlorhexidine DG

Biofilm bzw. Plaque ist der Grund für verschiedenste Veränderungen im Mundbereich.

Chlorhexidindigluconat besitzt nachweislich eine Wirkung gegen Plaque.

In der Formel von **KIN® GINGIVAL** enthalten ist Alpantha, ein aus Provitamin B_5 und Allantoin gebildeter Komplex, der die Aufnahme beider Wirkstoffe verstärkt und damit deren wundheilenden, revitalisierenden und regenerierenden Eigenschaften auf das Zahnfleischgewebe erhöht.

Anwendungsgebiete:

- Reduzierung von Biofilm auf den Zähnen
- Pflege und Stärkung von empfindlichem Zahnfleisch
- Mundhygiene bei Parodontoseleiden (Mundspülung)

Gegenanzeigen:

Patienten, die überempfindliche Reaktionen auf Chlorhexidin gezeigt haben, ist von der Anwendung abzuraten.

Warnhinweise:

- In einigen Fällen kann es zu Veränderungen des Geschmackssinns und Brennen auf der Zunge kommen, was im allgemeinen mit der kontinuierlichen Weiteranwendung des Produkts nachlässt.
- Durch längere Anwendung und Kontakt mit bestimmten Getränken und Speisen wie Rotwein und Kaffee sowie durch Rauchen können Verfärbungen an Zähnen und Zahnfüllungen auftreten. Diese Verfärbungen sind nicht dauerhaft und können mit Hilfe einer adäquaten Zahnprofilaxe entfernt werden.

Anwendung:

Zahncreme

Die Zähne mindestens zweimal pro Tag während 2 bis 3 Minuten putzten, vorzugsweise nach jeder Mahlzeit und vor dem Zubettgehen.

Mundspüllösung

Zweimal täglich morgens und abends mit 15ml Produkt 30 Sekunden lang eine Mundspülung machen. Bis eine halben Stunde nach der Anwendung sollte auf die Zunahme von Speisen oder Getränke verzichtet werden.

Es kann auch ein Mundspülgerät verwendet werden, dann die **KIN® GINGIVAL** Lösung in einem Mischungsverhältnis von 1:1 oder 2:1 verdünnen.

Nicht schlucken.

Als ideale Ergänzung zur Mundspüllösung **KIN® GINGIVAL** empfiehlt sich die Anwendung von **KIN® GINGIVAL** Zahncreme gemäß den Anweisungen Ihres Zahnarztes.

Aufbewahrung: Bei Temperaturen unter 30ºC lagern.

Es ist zu empfehlen, **KIN® GINGIVAL** zwei Wochen lang zu benutzen, bzw. die Anweisungen Ihres Zahnarztes zu befolgen.

Darreichungsformen (Nur in bestimmten Märkten):
KIN® GINGIVAL Mundspüllösung: Flasche mit 250ml und 500ml.
KIN® GINGIVAL Zahncreme: Tube mit 75ml.

Die Ratschläge Ihres Zahnarztes und Ihres Apothekers sind eine Garantie für die optimale Gesundheit von Zähnen und Zahnfleisch.

KIN® GINGIVAL — GR

0.12 % Chlorhexidine DG

Η βιομεμβράνη ή οδοντική πλάκα είναι η αρχή πολλών στοματικών παθήσεων.

Η διγλουκονική χλωρεξιδίνη έχει αποδειχτεί ότι διαθέτει δράση κατά της πλάκας

Η σύνθεση περιέχει Alpantha, ένα συστατικό που συνδυάζει προβιταμίνη B_5 και αλλαντοΐνη, το οποίο ενισχύει την απορρόφηση των δύο ουσιών. Αυτό βοηθάει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση του ουλικού ιστού.

Ενδείξεις:
- Ενισχύει τη μείωση της οδοντικής πλάκας
- Βοηθάει, ενισχύει και δυναμώνει τα ευαίσθητα ούλα
- Στοματική υγιεινή κατά τη διάρκεια οδοντιατρικών θεραπειών (στοματικό διάλυμα).

Αντενδείξεις:

Το προϊόν αντενδείκνυται σε αθενείς με υπερευαισθησία στη χλωρεξιδίνη.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:

-Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθεί αλλοίωση της γεύσης. Αυτό γενικά μειώνεται με τη συνεχή χρήση του προϊόντος.
-Μετά από μακρόχρονη χρήση και λόγω επαφής με τον καπνό του τσιγάρου και ορισμένα τρόφιμα και ποτά, όπως το κόκκινο κρασί και ο καφές, μπορεί να παρατηρηθεί κηλίδωση των δοντιών και των σφραγισμάτων. Η κηλίδωση αυτή δεν είναι μόνιμη και μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από τον οδοντίατρό σας.

Δοσολογία και οδηγίες χρήσης:

Οδοντόπαστα

Βουρτσίστε τα δόντια σας για 2 ή 3 λεπτά, τουλάχιστον 2 φορές ημερησίως, κατά προτίμηση μετά τα γεύματα και πριν την κατάκλιση.

Στοματικό διάλυμα

Κάνετε πλύσεις με 15ml από το αναραίωτο διάλυμα, δύο φορές την ημέρα, πρωί και βράδυ για μισό λεπτό. Συνιστάται η μη κατανάλωση τροφής ή ποτού για τουλάχιστον μισή ώρα μετά τη χρήση του προϊόντος.

Μην καταπίνετε το προϊόν.

Ως συμπληρωματικό του διαλύματος **KIN® GINGIVAL** στην καθημερινή στοματική υγιεινή, συνιστάται η χρήση της οδοντόπαστας **KIN® GINGIVAL**. Βουρτσίστε πρώτα τα δόντια σας με την οδοντόπαστα και αμέσως κάνετε πλύσεις με το στοματικό διάλυμα. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του οδοντιάτρου σας.

Συνιστάται η χρήση του **KIN® GINGIVAL** για 2 εβδομάδες ή όπως έχει συστηθεί από τον οδοντιάτρό σας.

Αποθήκευση:
Διατηρείτε το προϊόν σε θερμοκρασία κάτω των 30 ºC.

Ζητήστε τη συμβουλή του οδοντίατρου ή του φαρμακοποιού σας.
Έτσι θα εξασφαλίσετε την άριστη υγεία των δοντιών σας.

KIN® GINGIVAL — RO

0.12 % Chlorhexidine DG

Biofilmul sau placa dentara stau la originea afectiunilor de la nivelul cavitatii bucale.

S-a demonstart ca digluconatul de clorhexidina are efect de prevenire a formarii placii bateriene.

Compozitia include Alpantha, un compus ce combinat cu provitamina B_5 si alantoina, potenteaza absorbtia ambelor substante. Acest lucru are ca efect tonifierea gingiilor.

Indicatii:
- Reducerea biofilmului.
- Tonifierea gingiilor delicate.
- Asigurarea igienei orale inaintea interventiilor stomatologice (apa de gura).

Contraindicatii:

Produsul este contraindicat pacientilor cu hipersensibilitate la clorhexidina.

Precautii:

-Atenuarea simtului gustativ. Daca produsul se foloseste continuu acest efect advers se diminueaza in timp.
-Patarea dintilor si a obturatiilor poate aparea dupa folosirea indelungata sau dupacontactul cu tutunul, anumite alimente sau bauturi ca vinul rosu sau cafeaua. Aceste pete nu sunt permanente si pot fi indepartate usor de catre dentist prin periaj profesional.

Dozare si indicatii pentru administrare:

Pasta de dinti

Periati dintii 2-3 minute, cel putin de doua ori pe zi, preferabil dupa mese si inaintea culcarii.

Apa de gura

Clatiti de doua ori pe zi, dimineata si seara pentru 30 secunde, cu 15 ml de produs nediluat. Este recomandat sa nu mancati sau sa beti timp de jumatate de ora dupa utilizarea produsului.

Nu inghititi.

In completarea Apei de gura **KIN® GINGIVAL**, recomandam folosirea pastei de dinti **KIN® GINGIVAL**. Intai periati cu pasta de dinti si apoi imediat clatiti cu apa de gura. Intotdeauna urmati indicatiile dentistului.

este recomandat sa utilizati **KIN® GINGIVAL** doua saptamani sau la indicatiile medicului stomatolog.

Conditii de depozitare:
A se depozita la temperaturi mai mici de 30 ºC.

Urmati sfatul medicului stomatolog sau al farmacistului pentru o sanatate orala optima.

10 mm

620 x 155 mm

10 mm

KIN®GINGIVAL

CZ

0.12 % Chlorhexidine DG

Biofilm nebo zubní plak jsou původci různých změn v ústech.

Chlorhexidin diglukonát prokázal účinnost proti plaku.

Formula obsahuje Alpantha, sloučeninu kombinující provitamin B_5 a allantoin, který potencuje vstřebávání obou látek. To přispívá k posílení a zvýšení tonu tkání dásní.

Indikace:
-Podporuje zmenšení zubního biofilmu
-Pomáhá posílit a zvýšit tonus jemných dásní
-Ústní hygiena během stomatologických výkonů (ústní voda).

Kontraindikace:
Tento produkt je kontraindikován u pacientů, u kterých se projevily reakce přecitlivělosti na chlorhexidin.

Upozornění:
- V některých případech se mohou vyskytnout změny vnímání chutí. Tyto obvykle vymizí s pokračujícím používáním výrobku.
- Při dlouhodobém používání a po kontaktu s tabákem a některými potravinami a nápoji, jako je červené víno a káva, může dojít ke zbarvení zubů a zubních výplní. Toto zbarvení není trvalé a Váš zubní lékař nebo hygienik jej může snadno odstranit.

Dávkování a pokyny pro použití:

Zubní pasta

Čistěte si zuby po dobu 2 až 3 minut a to nejméně dvakrát denně, nejlépe po jídle a před spaním.

Ústní voda

Vyplachujte dvakrát denně, ráno a večer, 15 ml nezředěného produktu po dobu 30 sekund. Nedoporučuje se jíst ani pít alespoň půl hodiny po použití přípravku.

Nepolykejte.

Jako doplněk ke **KIN® GINGIVAL** ústní vodě doporučujeme použití Kin Gingival zubní pastu. Vyčistěte si zuby nejprve pastou a ihned vypláchněte ústní vodou. Vždy postupujte podle pokynů svého zubního lékaře.

Doporučujeme používat **KIN® GINGIVAL** po dobu 2 týdnů nebo podle doporučení Vašeho zubního lékaře.

Podmínky skladování: Uchovávejte produkt při teplotě pod 30 °C.

Zeptejte se svého lékárníka o radu. Tím zajistíte optimální zdraví ústům a zubům.

KIN®GINGIVAL

BG

0.12 % Chlorhexidine DG

Биофилмът, или зъбната плака, е причина за редица промени в устната кухина. Хлорхексидин диглюконатът е доказал своето ефективно противодействие на натрупването на зъбна плака.

Формулата включва Alpantha – съединение, в чийто състав влизат провитамин B_5 и алантоин, който усилва абсорбирането на двете вещества и помага за заздравяване и повишаване на тонуса на гингивалната тъкан.

Показания:
- Подпомага намаляването на зъбния биофилм.
- Помага за заздравяване и повишаване на тонуса на чувствителните венци.
- Устна хигиена при зъболекарски интервенции (вода за уста).

Противопоказания:
Този продукт е противопоказен за пациенти със свръхчувствителност към хлорхексидин.

Предупреждения:
- В някои случаи могат да възникнат промени във вкуса. Това усещане като цяло намалява с продължителната употреба на продукта.
- След продължителна употреба и след консумация на тютюн и определени храни и напитки като червено вино и кафе може да се появи оцветяване на зъбите и пломбите. Това оцветяване не е постоянно и може лесно да бъде отстранено от вашия зъболекар или специалист по устна хигиена.

Дозиране и указания за употреба:
Паста за зъби
Търкайте зъбите с четка в продължение на 2-3 минути поне два пъти дневно, за предпочитане след хранене и преди сън.

Вода за уста
Изплаквайте два пъти дневно – сутрин и вечер за по 30 секунди, с по 15 ml неразреден продукт. Препоръчително е да не се храните и да не пиете течности в продължение поне на половин час след използване на продукта.

Не поглъщайте.
В допълнение към вода за уста **KIN® GINGIVAL** препоръчваме използването на паста за зъби Кин Гингивал. Най-напред търкайте зъбите с четка и паста за зъби и веднага след това изплакнете с вода за уста. Винаги спазвайте указанията на своя зъболекар.
Препоръчително е да използвате **KIN® GINGIVAL** в продължение на 2 седмици или съгласно предписанията на вашия зъболекар.

Съхранение: Съхранявайте продукта при температура под 30оС.

Консултирайте се с вашия фармацевт. Това ще гарантира възможно най-доброто здравословно състояние на вашите уста и зъби.

KIN®GINGIVAL

HU

0.12 % Chlorhexidine DG

A biofilm vagy dentális plakk különböző elváltozásokat okozhat a szájban.
A klórhexidin-diglukonát bizonyítottan fog-plakk inaktiváló hatású.
A **KIN® GINGIVAL** formulája Alpantha-t, vagyis egy B_5 provitamin és allantoin keveréket tartalmaz, mely elősegíti az említett két hatóanyag felszívódását és ezzel erősíti és tonifikálja a fogínyt.

Alkalmazás:
- A fog-plakk képződés csökkentésére.
- Az érzékeny fogíny erősítésére és tonifikálására.
- Szájhigiénia periodontális kezelések alatt (szájvíz).

Ellenjavallatok:
Ne használja a készítményt kimutatott klórhexidinnel szembeni túlérzékenység esetén.

Mellékhatások:
- Ízérzékelés csökkentést, illetve nyelven csípő érzést okozhat. Ezek a tünetek a termék folyamatos használatával általában csökkennek.
- A készítmény hosszan tartó használata és bizonyos ételek és italok – mint például a vörösbor vagy a kávé – fogyasztása, illetve dohányzás esetén előfordulhat a fogak, illetve a fogtömések elszíneződése. Ez az elszíneződés csak átmeneti hatású, szakszerű fogtisztítással eltávolítható.

Használat:

Fogkrém
Naponta legalább kétszer 2-3 percig tisztítsa meg a fogait, lehetőleg az étkezések után és lefekvés előtt.

Szájvíz
15 ml hígítás nélküli szájvízzel 30 másodpercig öblögessen naponta kétszer, reggel és este.
A szájvíz használata után legalább 30 percig ne fogyasszon semmiféle ételt, vagy italt.

Nem szabad lenyelni.
A **KIN® GINGIVAL** Szájvíz kiegészítéséhez ajánlatos a **KIN® GINGIVAL** Fogkrém használata. Először mossa meg fogait a fogkrémmel, majd öblögessen a szájvízzel. Mindig kövesse a fogorvos utasításait.
A **KIN® GINGIVAL** javasolt használati ideje 2 hét, vagy a fogorvos által előírt időtartam.

Tárolás: A terméket 30C° alatti hőmérsékleten tárolja.

További információért és az optimális száj –és fogegészséget biztosító tanácsokért forduljon a fogorvoshoz, illetve a gyógyszerészhez.

KIN®GINGIVAL

RU

Хлоргексидина диглюконат 0,12%

Зубной налет является причиной различных изменений в полости рта.
Благодаря хлоргексидина диглюконату, средства **KIN® GINGIVAL** предотвращают и сдерживают рост зубного налета.
Alpantha – еще один компонент **KIN® GINGIVAL**, в состав которого входит аллантоин и провитамин B_5. Благодаря взаимоусиливающему действию этих двух составляющих, Alpantha быстро проникает в поврежденные ткани и способствует восстановлению слизистой десен.
Рекомендуется использовать для:
- уменьшения зубного налета;
- укрепления и защиты ослабленных десен;
- гигиены полости рта до и после стоматологических вмешательств.

Предостережения
В некоторых случаях может возникнуть изменение вкусовых ощущений, которое постепенно исчезает при дальнейшем использовании средства.
При длительном применении средства, а также при употреблении некоторых продуктов и напитков, таких, как красное вино и кофе, могут появиться пятна на зубах и пломбах. Эти пятна временные и легко могут быть удалены после проведения профессиональной гигиены полости рта.

Указания по применению
Зубная паста
Чистить зубы в течение 2-х минут не менее 2-х раз в день, желательно после приема пищи и перед сном.
Ополаскиватель для полости рта
Использовать 15 мл неразведенного раствора для полоскания рта 2 раза в день, утром и вечером, в течение 30 секунд.

При орошении рта с помощью ирригатора ополаскиватель разбавляют водой в соотношении 1:1 или 2:1.

Средства KIN® GINGIVAL не глотать.
После использования **KIN® GINGIVAL** не принимать никакой пищи и напитков в течение получаса.
В качестве идеального дополнения к ополаскивателю для полости рта KIN® GINGIVAL рекомендуется применение зубной пасты **KIN® GINGIVAL**.
Средства **KIN® GINGIVAL** следует использовать в течение 2-х недель или в соответствии с рекомендациями стоматолога.

Не рекомендуется лицам с повышенной чувствительностью к компонентам, входящим в состав средства.

Условия хранения
Хранить при температуре не выше +30° С.

Ополаскиватель для полости рта **KIN® GINGIVAL**: флаконы 250 и 500 мл
Зубная паста **KIN® GINGIVAL**: туба 75 мл

За более полной информацией обратитесь к стоматологу.

KIN®GINGIVAL

UA

0.12 % Chlorhexidine DG

Зубний наліт є причиною різних захворювань ротової порожнини, найбільш поширені з яких - хвороби пародонту.
Хлоргексидину диглюконат проявляє антимікробну дію відносно мікроорганізмів, що містяться у зубному нальоті. Він запобігає і контролює ріст зубного нальоту.
До складу **KIN® GINGIVAL** входить Alpantha - компонент, що містить провітамін B_5 і алантоїн, які сприяють покращенню епітелізації, загоєнню і регенерації слизової оболонки ясен.
Засоби **KIN® GINGIVAL** призначені для усіх видів гігієни ротової порожнини.

Показання:
- Зменшення зубного нальоту
- Зміцнення ясен
- Гігієна ротової порожнини під час та після стоматологічних втручань (полоскання)

Протипоказання:
Підвищена чутливість до інгредієнтів.

Особливі вказівки:
- У деяких випадках може виникнути зміна смакових відчуттів, що зазвичай зменшується при продовженні застосування засобу.
- Після тривалого застосування засобу, а також після контакту з деякими продуктами та напоями, таких, як червоне вино та кава, або тютюн, можуть з'явитися плями на зубах і пломбах. Ці плями не є постійними і можуть бути видалені вашим стоматологом.

Дозування та вказівки для застосування:
Зубна паста
Чистити зуби мінімум 2-3 хвилини 2 рази на день, а бажано після кожного прийому їжі та перед сном.
Полоскання для ротової порожнини
Полоскати порожнину рота 2 рази на день, вранці та ввечері, протягом 30 секунд в дозі 15 мл нерозбавленого засобу.
В якості ідеального доповнення до ополіскувача **KIN® GINGIVAL** рекомендується застосовувати зубну пасту **KIN® GINGIVAL**. Слідуйте вказівкам Вашого стоматолога. Бажано не приймати ніякої їжі та напоїв, як мінімум протягом півгодини після використання **KIN® GINGIVAL**.

Не ковтати.

Рекомендується використовувати **KIN® GINGIVAL** протягом 2 тижнів або так, як рекомендує Ваш стоматолог.

Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 30 ° С.

Форма випуску
Полоскання для ротової порожнини **KIN® GINGIVAL**: флакони 250 і 500 мл

Зубна паста KIN® GINGIVAL: туба 75 мл

Запитайте поради у Вашого стоматолога або фармацевта. Це допоможе оптимально забезпечити здоров'я ротової порожнини та зубів.

KIN®GINGIVAL

KZ

0.12 % Chlorhexidine DG

°Тістегі жұмсақ қақ ауыз қуысының әр түрлі ауруларының себебші болып табылады, солардың көп таралғандарының бірі – пародонт аурулары.
Хлоргексидин диглюконаты тістің жұмсақ қағының құрамында болатын микроорганизмдерге қарсы микробты белсенділік қасиетіне ие. Ол тістің жұмсақ қағының өсуін болдырмайды және бақылап отырады.
KIN® GINGIVAL құрамына Alpantha кіреді – құрамында заттардың сіңуін күшейтетін В 5 пен аллонтоин бар компонент. Alpantha 'эпителизацияның жақсаруына, қызыл иектің жазыла бастауы мен регенерациясына мүмкіндік береді.

Көрсеткіштер:
– Тістің жұмсақ қағының азаюы;
– Қызыл иекті күшейту;
– Стоматологтың араласуы кезінде ауыз қуысының гигиенасы (шайғыш).

Қолдануға болмайтын жағдайлар:
Құралдың құрамына кіретін компоненттерге жоғары сезімталдық.

Айрықша нұсқаулар:
- Кейбір жағдайларда дәм қабілетінің өзгеруі болу мүмкін, ол әдетте құралды қолдануды жалғастыра бергеннен кейін төмендейді.
- Құралды ұзақ қолданғаннан кейін, және де кейбір тағамдар мен кофе, қызыл шарап сияқты сусындармен байланысты болғаннан кейін пломбалар мен тістерде дақтар пайда болуы мүмкін. Бұл дақтар тұрақты емес және оларды сіздің стоматологыңыз тазалап бере алады.

Дозасы және қолдану шарттары:

Тіс пастасы:
Тісіңізді күніне 2 рет 2-3 минуттан кем емес уақыт тазалаңыз, жақсысы - әр тамақ қабылдауы мен ұйқыға жатар алдында пайдалану.

Шайғыш:
Күніне 2 рет, таңертең және кешке, 30 секунд бойы араластырылмаған құралдың 15 мл дозасымен ауыз қуысын шайқаңыз.

Жұтпаңыз.

KIN® GINGIVALL шайғышына мінсіз қосымша ретінде **KIN® GINGIVAL** тіс пастасын пайдалануды ұсынамыз. Өзіңіздің стоматологыңыздың нұсқауларын қолданыңыз.
KIN® GINGIVAL қолданғаннан кейін жарты сағаттан кем емес уақыт ішінде ешқандай тағам мен сусындарды қабылдамаған жөн.
KIN® GINGIVALL-ды 2 апта бойы немесе стоматологыңыз кеңес еткен уақыт бойы пайдаланғаныңыз дұрыс.

Сақтау шарттары:
30° С температурасынан жоғары емес жерде сақтау керек.

Шығарылу түрі:
Ауыз қуысын шаюға арналған **KIN® GINGIVAL** шайғышы: 250 және 500 мл шишалар.

KIN® GINGIVAL тіс пастасы: 75 мл туба.

Өзіңіздің стоматологыңыз бен фармацевтіңізбен кеңесіңіз. Бұл ауыз қуысы мен тістеріңіздің денсаулығын тиімді түрде қамтамасыз етуге көмектеседі.

KIN®GINGIVAL

UZ

0.12 % Chlorhexidine DG

Тиш қатламлари (доғлари) оғиз бўшлиғининг турли касалланишлари сабаби бўлиб, улардан энг кўп тарқалгани – пародонт касаллиги ҳисобланади.

Хлоргексидин диглюконат пародонт касаллигини қўзғатувчи микроорганизмларга нисбатан микробга қарши фаолликка эгадир. У тиш қатламланиши (доғланиши) олдини олади ва кучайишини тўхтатади.

Alpantha – **KIN® GINGIVAL**нинг таркибий моддаси бўлиб, унинг таркибига аллантоин ва B_5 провитамини киради. Ушбу икки таркибий модданинг ўзаро кучайтирувчи таъсири туфайли, Alpantha шикастланган тўқималар ичига тез сингиб боради ва шиллиқ милкнинг тикланишига кўмаклашади.

Қуйидагилар учун фойдаланиш тавсия қилинади:
- оғиз бўшлиғи шиллиқ пардаларининг яллиғланишли касалликларини профилактика қилиш;
- тиш қатламланиши (доғланиши)ни камайтириш;
- стоматологик муолажалар вақтида ва муолажалардан сўнг оғиз бўшлиғи гигиенаси (оғиз чайиш воситаси).

Огоҳлантириш
Айрим ҳолларда, таъм сезгиларининг ўзгариши пайдо бўлиши мумкин, кейинчалик мазкур воситадан фойдаланиш натижасида аста-секин бартараф қилинади.
Мазкур воситадан узоқ вақт мобайнида фойдаланилганда, шунингдек айрим маҳсулотлар ҳамда қизил вино ва қаҳва каби ичимликлар истеъмол қилинганда, тишларда ва пломбаларда доғлар пайдо бўлиши мумкин. Ушбу доғлар вақтинчалик бўлиб, оғиз бўшлиғининг малакали гигиенаси ўтказилишида осон олиб ташланиши мумкин.

Қўлланилиши бўйича кўрсатмалар

Тиш пастаси
Тишларни ҳар сафар таом тановул қилингандан кейин ва ухлаш олдидан кунига 2 марта энг камида 3 дақиқа мобайнида тозалаш мақсадга мувофиқдир.

Оғиз чайиш воситаси.
Оғиз чайиш учун мўлжалланган 15 мл аралаштирилмаган эритмадан кунига 2 марта, эрталаб ва кечқурун, 30 сония мобайнида фойдаланиш лозим.

KIN® GINGIVAL воситаларини ютиб юбориш мумкин эмас.
KIN® GINGIVAL воситаларидан фойдаланилгандан сўнг, ярим соат мобайнида ҳеч қандай таом ва ичимликлар тановул қилинмасин.
KIN® GINGIVAL оғиш чайиш воситаларига жуда мос қўшимча сифатида KIN® GINGIVAL тиш пастасидан фойдаланиш тавсия қилинади.
KIN® GINGIVAL воситаларидан энг кўпи билан 3 ҳафта мобайнида ёки стоматолог тавсияларига мувофиқ равишда фойдаланиш лозим.
Мазкур воситанинг таркибига кирувчи моддаларга юқори сезувчанликка эга шахслар томонидан қўлланилиши тавсия қилинмайди.

Сақлаш шартлари
+30° С даражадан юқори бўлмаган ҳарорат остида сақлансин.

KIN® GINGIVAL оғиз бўшлиғи учун чайиш воситаси: 250 ва 500 мл сиғимли флаконлар.

KIN® GINGIVAL тиш пастаси: 75 мл сиғимли туба.

Янада тўлиқ маълумотлар олиш учун стоматолог мутахассисга мурожаат қилинг.

KIN®GINGIVAL

LV

0.12 % Chlorhexidine DG

Zobu aplikums ir galvenais cēlonis dažādām mutes dobuma saslimšanām, tai skaitā periodontītam (paradontozei). Hlorheksidīna diglukonātam piemīt antibakteriāla iedarbība, tas iznīcina mikroorganismus un samazina aplikuma veidošanos.
KIN® GINGIVAL sastāvā ietilpst provitamīnu B_5 un alantoīnu saturošs komplekss Alpantha, kas uzlabo vielu ārstniecisko vielu uzsūkšanos, paātrinot smaganu audu dzīšanas un reģenerācijas procesus.

Indikācijas:
- Aplikuma veidošanās mazināšanai
- Smaganu stiprināšanai
- Mutes dobuma higiēnai stomatoloģiskās ārstēšanas laikā

Kontrindikācijas:
Paaugtināta jutība uz kādu no produkta sastāvdaļām.

Brīdinājumi:
- Dažos gadījumos iespējamas garšas izmaiņas, kas samazināsies produktu lietojot
- Ilgstošas lietošanas gadījumā kā arī lietojot dažus pārtikas produktus (kafija, sarkanvīns), iespējama pigmenta veidošanās uz zobiem un plombēm, ko viegli noņemt zobārsta vai higiēnista apmeklējuma laikā.

Devas un lietošanas norādījumi:

Zobu pasta:
Tīrīt zobus vismaz 2-3 reizes dienā 3 minūtes, vēlams pēc ēšanas un pirms gulētiešanas.

Mutes skalojamais līdzeklis:
Skalot muti 2 reizes dienā (rītos un vakaros) 30 sekundes ar neatšķaidītu līdzekli. Neēst un nedzert vismaz 30 minūtes pēc skalošanas.

Nenorīt!
Labākam rezultātam iesakam **KIN® GINGIVAL** mutes skalojamo līdzekli lietot kopā ar **KIN® GINGIVAL** zobu pastu. Tīriet zobus ar zobu pastu un tūlīt skalojiet ar mutes skalojamo. Sekojiet zobārsta vai higiēnista norādījumiem.
Vēlamais **KIN® GINGIVAL** lietošanas laiks ir 2 nedēļas vai atbilstoši jūsu zobārsta vai higiēnista ieteikumiem.

Uzglabāšana:
Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt 30 °C.

Iepakojums:
Mutes skalojamais līdzeklis 250ml un 500ml pudele
Zobu pasta 75ml tūbiņa

Jautājiet zobārstam vai farmaceitam. Tas vislabāk palīdzēs saglabāt mutes un zobu veselību.

KIN®GINGIVAL

ET

0.12 % Chlorhexidine DG

Biofilm ja hambakatt on paljude suuõõneprobleemide põhjuseks.

Kloorheksidiin diglükonaadil on hambakatus esinevate mikroobide vastane toime.

Koostises sisalduv Alpantha on kombinatsioon provitamiin B_5 -st ja allantoiinist, mis soodustab mõlema koostisosa imendumist. Alpantha tugevdab ja toniseerib igemekudet.

Näidustused:
- Vähendab hambakattu.
- Tugevdab ja toniseerib igemekudet.
- Suuhügieeniks stomatoloogilise ravi perioodil (suuvesi).

Vastunäidustused:

Toode on vastunäidustatud, kui esineb ülitundlikkus kloorheksidiini suhtes.
Ettevaatust:

- Võib esineda maitsmismeele muutust, mis tavaliselt väheneb toote jätkuval kasutamisel.
- Toote pikaajalisel kasutamisel ning tubakatoodete ja mõningate toiduainete tarbimisel võivad tekkida plekid hambaemalile ja hambatäidisele. Plekid ei ole püsivad, need on kergesti eemaldatavad hambaarsti või hügienisti poolt.

Doseerimine ja kasutusjuhendid:

Hambapasta
Pesta hambaid 2 - 3 minutit vähemalt kaks korda päevas, soovitavalt peale sööki ja enne magamaminekut.

Suuvesi

Loputada kaks korda päevas, hommikul ja õhtul 30 sekundi jooksul 15ml lahjendamata tootega. Ei ole soovitav süüa ja juua vähemalt poolt tundi pärast toote kasutamist.

Mitte alla neelata.

Lisaks **KIN® GINGIVAL** suuveele on soovitatav kasutada **KIN® GINGIVAL** hambapastat – kõigepealt pesta hambad ja seejärel loputada koheselt suuveega. Jälgige alati oma hambaarsti soovitusi.

KIN® GINGIVAL hambapastat ja suuvett kasutada 2 nädala jooksul või vastavalt hambaarsti soovitusele.

Hoiustamine: temperatuuril kuni 30 °C

Küsige alati nõu apteekrilt või hambaarstilt, see tagab parima suu- ja hambahügieeni.

KIN®GINGIVAL

AR

إن جير الأسنان أو النيوفيلم هو أساس التغيرات في تجويف الفم، و أمراض اللثة هي أكثر هذه التغيرات شيوعاً.
مجموعة كين جينجيفال تستعمل مع جميع الإجراءات اللازمة للعناية بالأسنان بحيث يساعد على منع نمو الجير على الأسنان

الإستعمال:
للعناية بالفم (اللثة و الأسنان)

موانع الإستعمال: يحذر استعمال هذا المنتج عند وجود حساسية للكلوروهيكسيدين.

تحذيرات: يمكن حدوث اختلاف في التذوق و شعور بحرقة بسيطة، ولكن عادة ما تتلاشى كلياً مع الإستمرار في استعمال المنتج.
يحصل تصبغ و ملء للفراغات بين الأسنان مع الإستعمال الطويل، خصوصاً مع التدخين و تناول بعض المشروبات (كالنبيذ الأحمر و القهوة). هذا التصبغ ليس دائماً و يمكن إزالته بسهولة عند طبيب الأسنان.

طريقة الإستعمال:

غسول الفم: يستعمل مرتين يومياً، صباحاً و مساءً، لمدة نصف دقيقة ، يستعمل 15 مل من الغسول بدون تخفيف، ومن المستحسن أن لا تأكل أو تشرب خلال النصف ساعة بعد الإستعمال على الأقل.

يمكن إستعماله للغرغرة ايضاً، بحيث يتم تخفيف محلول **كين جينجيفال** مع الماء بنسبة 1 إلى 1 أو 2 إلى 1. لا يبلع.

من المستحسن استخدام Kin Gingival لمدة أسبوعين أو كما ينصح طبيب أسنانك

التخزين: يحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن 30 درجة مئوية.
العبوة: غسول الفم كين جينجيفال: 250 مل و 500 مل.

استشر الطبيب أو الصيدلي لضمان الصحة المثلى للفم والأسنان

KIN®GINGIVAL

EN

only for Saudi Arabia

0.12 % Chlorhexidine DG

Biofilm or dental plaque is the origin of various oral alterations.
KIN® GINGIVAL promotes the reduction of dental biofilm. This helps to strengthen and tone the gingival tissue.
Indications:
Oral Hygiene Care (Gums & Teeth).
Contraindications:
This product is contraindicated in patients that have demonstrated a hypersensitive reaction to chlorhexidine.
Precautions:
Taste alterations may occur in some cases. This generally diminishes with continued use of the product.
Staining of the teeth and fillings can occur after long term use and after contact with tobacco and certain food and beverages, such as red wine and coffee. This staining is not permanent and can be easily removed by your dentist.
Application:
Mouthwash
Rinse twice a day, morning and night, for 30 seconds, with 15 ml of the undiluted product. It is recommended to not eat or drink until at least half an hour after the use of the product.
An oral irrigator can also be used, diluting the solution of **KIN® GINGIVAL** with water at 1:1 or 2:1.
Do not swallow.
As an ideal complement to **KIN® GINGIVAL** mouthwash, we recommend the use of **KIN® GINGIVAL** toothpaste, following the instructions of your dentist.

It is recommended to use **KIN® GINGIVAL** for 2 weeks or as advised by your dentist.
Conservation:
Store product below 30ºC
Presentations: (only available in certain markets):
KIN® GINGIVAL mouthwash: 250 and 500 ml bottle.

Ask your dentist and pharmacist for advice. This will ensure optimal oral and dental health.

KIN®GINGIVAL

FS

0.12 % Chlorhexidine DG

پلاک میکروبی منشا بیماری های مختلف دهان است که بیشترین آن ها بیماری های لثه می باشد.
محصولات کین ژینژیوال با خاصیت آنتی باکتریال، جهت مداوای همه مشکلات دهانی که در درمان آن ها نیاز به یک ماده ضد میکروبی می باشد توصیه می شوند.
کلرهگزیدین دی گلوکونات به عنوان یک ماده موثر و قوی ضد میکروبی جهت درمان بیماری ها و مشکلات لثه معرفی شده است که از تشکیل و رشد پلاک های میکروبی جلوگیری می کند.
فرمول منحصر به فرد محصولات کین ژینژیوال شامل ®Alpantha می باشد که ماده ای است از ترکیب پروویتامین B_5 و آلانتوین که باعث افزایش جذب هر دو ترکیب شده، بافت مخاطی دهان را بازسازی کرده و احیا مجدد بافت لثه را تسریع و باعث بهبود آن می شود.

موارد مصرف:
-محافظت از دهان با خاصیت ضد میکروبی
-کاهش پلاک میکروبی
-محافظت و تقویت لثه در مراحل مختلف بیماری های لثه
-خاصیت ضد میکروبی برای ارتقای بهداشت دهان در مراحل مختلف بیماری های لثه و کمک به بهبود سریع آن

موارد منع مصرف:
بیمارانی که نسبت به کلرهگزیدین حساسیت شدید دارند نمی توانند از این محصولات استفاده کنند.

احتیاط:
در مواردی نادر تغییر در حس چشایی و احساس سوزش خفیف رخ می دهد که با ادامه مصرف، کاهش می یابد. در موارد خاص، استفاده طولانی مدت و یا استفاده همزمان با سیگار و مواد رنگی مانند قهوه و شراب قرمز باعث تغییر رنگ بسیار جزئی دندان ها و پرکردگی ها شده که دائمی نبوده و به راحتی توسط دندانپزشک قابل اصلاح می باشد.

میزان و روش مصرف:
خمیر دندان کین ژینژیوال:
روزی ۲ بار یا بیشتر، ترجیحا" بعد از غذا و قبل از خواب، برای ۲ تا ۳ دقیقه دندان های خود را مسواک بزنید.
دهانشویه کین ژینژیوال:
روزی ۲ بار، صبح و شب، با ۱۵ میلی لیتر محلول خالص به مدت ۳۰ ثانیه دهان را شستشو نمایید. توصیه می شود بعد از استفاده از دهانشویه، حداقل به مدت نیم ساعت از خوردن و آشامیدن خودداری نمایید.
در صورت استفاده از اریگیتور دهانی، با استفاده از آب، محلول را به نسبت۱ به ۱ یا ۲ به ۱ رقیق نمایید.
از فرو دادن دهانشویه اجتناب کنید.
برای نتیجه مطلوب، هم زمان از دهانشویه و خمیر دندان کین ژینژیوال استفاده نمایید. توصیه های دندانپزشک خود را انجام دهید.

شرایط نگهداری:
در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

فرآورده های عرضه شده:
دهانشویه کین ژینژیوال در بطری ۲۵۰ میلی لیتری
خمیر دندان کین ژینژیوال درتیوب ۷۵ میلی لیتری

برای اطمینان بیشتر در رعایت بهداشت دهان و دندان خود از دندانپزشک و یا دکتر داروساز راهنمایی بخواهید

KIN®GINGIVAL

GE

0.12 % Chlorhexidine DG

კინ®გინგივალი, მასში შემავალი ქლორჰექსიდინის ანტისეპტიკური მოქმედების გამო, გამოიყენება ღრძილების მავნე ბაქტერიებით (ძირითადი გამოვლინება - კბილის ბაქტერიული ნადებები) გამოწვეული დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობისათვის. ქლორჰექსიდინის ოპტიმალური კონცენტაცია (0,12%) ერთის მხრივ უზრუნველყოფს მის მაქსიმალური ანტისეპტიკურ მოქმედებას და მეორეს მხრივ მაქსიმალურად ამცირებს შესაძლო გვერდითი მოქმედებების რისკს.

გარდა ამისა, **კინ®გინგივალი** შეიცავს კომპანიის მიერ დაპატენტებულ პროვიტამინ B5-ისა და ალანტოინის კომბინაციას – ალპანთას®. ალპანთა®–ს უნიკალური ფორმულა, ანთების საწინააღმდეგო ეფექტთან ერთად, ხელს უწყობს ღრძილების ლორწოვანი ქსოვილის ეპითელიზაციას და გაჯანსაღებას.

გამოიყენება
- კბილის ნადებები და ქვების წარმოშვების საწინააღმდეგოდ;
- ღრძილების ქსოვილის გაჯანსაღებისათვის;
- პირის ღრუს ჰიგიენისათვის, სტომატოლოგიური პროცედურების ჩატარების პერიოდში (სავლები).

უკუჩვენება
კინ®გინგივალი –ს გამოყენება არ შეიძლება ქლორჰექსიდინის მიმართ მკვეთრად გამოხატული ჰიპერმგრძნობელობის დროს.

გაფრთხილება
- გარკვეულ შემთხვევებში შესაძლებელია შეიცვალოს საკვების გემოს შეგრძნება. ეს, შესაძლოა შეგრძნება, გაქრება მისი გამოყენების გაგრძელების შემდეგ;
- გარკვეული სახეობის პროდუქტებთან ერთად ხანგრძლივი გამოყენებისას (ყავა, წითელი ღვინო, ასევე მწეველების შემთხვევაში) შესაძლოა კბილებზე და ბჟენებზე ლაქების წარმოშვება, თუმცა ეს ლაქები არ არის მუდმივი და მისი მოცილება ადვილად შესაძლებელია სტომატოლოგის მიერ.

გამოყენების მეთოდი
კინ®გინგივალი კბილის პასტა
გაიხეხეთ კბილები არანაკლებ 3 წუთის განმავლობაში, დღეში 2-ჯერ, ძირითადი საკვების მიღების შემდეგ და ძილის წინ.

კინ®გინგივალი პირის ღრუს სავლები
გამოივლეთ გაუზავებლად 15 მლ-ს ოდენობით 30 წამის განმავლობაში დღეში 2-ჯერ დილით და საღამოს ძილის წინ, მაქსიმუმ 2 კვირის განმავლობაში. გამოვლებისას სითხე არ გადაგეყლაპოთ. გამოყენებიდან სულ მცირე ½ საათის განმავლობაში თავი აარიდეთ საკვების ან სასმელის მიღებას.
კინ®გინგივალი სავლებისგან მაქსიმალური შედეგის მიღებისათვის რეკომენდირებულია მისი გამოყენება **კინ®გინგივალი** კბილის პასტასთან ერთად.

გამოშვების ფორმა
კინ®გინგივალი კბილის პასტა 75 მლ
კინ®გინგივალი პირის ღრუს სავლები 250 და 500 მლ

მწარმოებელი:
Laboratorios Kin S.A.,ესპანეთი

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მიმართეთ სტომატოლოგს.

10 mm

10 mm

10 mm