

Descriere Scurta

Laxit®med este un laxativ sub forma de pulbere pentru solutie orala, care ajuta la normalizarea tranzitului intestinal printr-o actiune naturala, fara a irita mucoasa digestiva.

Indicatii

Pentru tratamentul simptomatic al constipatiei ocazionale si cronice la adulti si copii peste 6 luni.

Avantaje

Ideal atat pentru tratarea constipatiei ocazionale, cat si pentru cea cronica.

Nu contine arome, indulcitori sau conservanti.

Se poate amesteca cu orice bautura, chiar si calda (ceai, lapte, suc de fructe sau supa), fara a modifica gustul acestora.

Nu este iritant al mucoasei digestive precum laxativele antrachinonice.

Poate fi administrat in conditii de siguranta atat la sugari, cat si la pacientii varstnici.

Nu produce toleranta.

Compozitie

Fiecare plic contine 5g Macrogol 4000.

Nu contine aromatizanti si nici alti excipienti.

Doze si mod de administrare

Adulti: 2 plicuri de 1-3 ori pe zi, in functie de raspunsul individual.

Pentru obtinerea unui efect mai rapid, o doza de 4 plicuri (20 g macrogol 4000) poate fi luata in administrare unica.

In cazul utilizarii prelungite, doza poate fi redusa la 2 plicuri de 1-2 ori pe zi, administrate in zile alternative (ex: intr-o zi se pot administra 2 plicuri, de preferina seara inainte de culcare, iar in urmatoarea zi se pot administra 2 plicuri in intervalul dintre micul dejun si pranz si 2 plicuri seara inainte de culcare).

Copii:

- 6 luni-12 luni: 1 plic pe zi;

- 1-4 ani: 1 plic de 1-2 ori pe zi;

- 5-8 ani: 2-3 plicuri pe zi;

- peste 8 ani: 2 plicuri de 1-2 ori pe zi.

Inainte de inceperea tratamentului trebuie excluse tulburarile organice. In acest sens, pentru grupa de varsta 6-12 luni se recomanda un consult medical.

A nu se depasi doza maxima zilnica.

Continutul unui plic (5 g) se dizolva in 50-100 ml apa si apoi se administreaza pe cale orala.

Laxit®med nu modifica gustul bauturii. Se recomanda administrarea intre mese sau, in cazul unei singure doze, seara inainte de culcare.

Laxit®med se utilizeaza pana la restabilirea tranzitului intestinal normal, dar nu mai mult de 28 de zile consecutiv. Administrarea se poate relua dupa 2 zile de pauza.

Recomandari

Nu utilizati Laxit®med in caz de hipersensibilitate la macrogol, afectiuni inflamatorii intestinale severe (colita ulceroasa, boala Crohn), megacolon toxic, perforatie sau risc de perforatie, ocluzie

intestinala, sindrom abdominal dureros de cauza nedeterminata.

Persoanele predispuse la dezechilibre electrolitice, cum ar fi cele cu insuficienta hepatica sau renala, trebuie sa utilizeze cu precautie Laxit®med.

A nu se lasa la indemana copiilor.

A se pastra in ambalajul original.

Nu sunt necesare conditii speciale de pastrare.

Mod de eliberare

Fara prescriptie medicala.

Forma de prezentare

Fiecare cutie contine 10/20/40 plicuri si instructiunile de utilizare. Laxit med este un dispozitiv medical din clasa IIa, in concordanta cu Directiva Europeana pentru dispozitive medicale 93/42/EEC.